レジメン名 ： キイトルーダ療法　3週毎

疾患名 ： 非小細胞肺がん

投与間隔（1コース期間）： 3週間

総コース数 ： PDまで

特記事項 ： PD-L1陽性確認

	投与順序	レジメン内容（医薬品名）	投与量	単位（mg/㎡,V等）	投与方法（手技）	投与時間（速度等）	投与日(Day1等)	備考（内服薬の用法等）
Rp.	1	生食100mL	1	本	点滴静注		Day1	フィルター付きセットを使用すること ルート確保用
		キイトルーダ	200	mg/body				
	2	生食100mL	1	本	点滴静注	30分	Day1	
	3	生食50mL	1	本	点滴静注		Day1	フラッシュ用

減量基準

減量規定（副作用名等）	減量条件（検査値等）	抗癌剤名	減量割合等（減量後の割合又は投与量）

参考文献

①Pembrolizumab versus Chemotherapy for PD-L1-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2016 Nov 10;375(19):1823-1833.

②Pembrolizumab versus chemotherapy for previously untreated, PD-L1-expressing, locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-042): a randomised, open-label, controlled, phase 3 trial. Lancet. 2019 May 4;393(10183):1819-1830.