レジメン名　：　キイトルーダ療法　3週毎

疾患名　：　MSI-Hiを有する固形がん

投与間隔（1コース期間）　：3週間

総コース数　：　PDまで

特記事項　：　インラインフィルターを使用
MSI-Highを有する固形がん

	投与順序	レジメン内容（医薬品名）	投与量	単位（mg/㎡,V等）	投与方法（手技）	投与時間（速度等）	投与日(Day1等)	備考（内服薬の用法等）
Rp.	1	生食100mL	1	本	点滴静注		D1	ルート確保用、インラインフィルターを使用すること
		キイトルーダ	200	mg/body				
	2	生食100mL	1	本	点滴静注	30分	D1	
	3	生食50mL	1	本	点滴静注		D1	フラッシュ用

減量基準

減量規定（副作用名等）	減量条件（検査値等）	抗癌剤名	減量割合等（減量後の割合又は投与量）

参考文献

Efficacy ofpembrolizumab in patients with noncolorectal high microsatellite instability/mismatch repair-deficient cancer result from the phase Ⅱ KEYNOTE-158 Study(Aurelien Marabelle et.al Journal of Clinical Oncology Volume38. 2020 Jan 1;38(1):11-19. 155.091.144.231

Phase II Open-Label Study of Pembrolizumab in Treatment-Refractory, Microsatellite Instability-High/Mismatch Repair-Deficient Metastatic Colorectal Cancer: KEYNOTE-164 Dung T Le et.al J Clin Oncol

キイトルーダ適正使用ガイド、添付文書