

レジメン名 : PTX(3投1休)+サイラムザ(Bi-weekly)

疾患名 : 胃がん

投与間隔 (1コース期間) : 28日間

総コース数 : PDになるまで

特記事項 :

投与 順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注		D1、D8、D15	ルート確保用/フィルター付きルートの使用
	生理食塩液 50mL	1	袋				
	デキサト 6.6mg	1	瓶				
	ファモチジン20mg	1	本				
	2 ポララミン注 5mg	2	本	点滴静注	30分	D1、D8、D15	
	サイラムザ	8	mg/kg				サイラムザの分の生食を抜いて全量250mLにする 初回60分、2回目以降30分まで短縮可
	3 生理食塩液 250mL	1	袋	点滴静注		D1、D15	
	4 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注	30分	D1、D8、D15	
	パクリタキセル	80	mg/m ²				
	5 生理食塩液 250mL	1	袋	点滴静注	60分	D1、D8、D15	
	6 生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注	15分	D1、D8、D15	
2021.6サイラムザ投与速度変更(化学療法委員会にて承認済のため医師サイン省略)							

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

- ・Fuchs CS, et al. Ramucirumab monotherapy for previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (REGARD): an international, randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2014; 383: 31-9
- ・Wilke H, et al. Ramucirumab plus paclitaxel versus placebo plus paclitaxel in patients with previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (RAINBOW): a double-blind, randomised phase 3 trial. Lancet oncol. 2014; 15: 1224-35