レジメン名：weekly PTX(6投1休)

疾患名　：　食道がん

投与間隔（1コース期間）　：7週毎

総コース数　：　PDになるまで

特記事項　：　フィルター付きルート使用

	投与順序	レジメン内容（医薬品名）	投与量	単位(mg/㎡,V等)	投与方法（手技）	投与時間（速度等）	投与日(Day1等)	備考（内服薬の用法等）
Rp.	1	生理食塩液　100mL	1	本	点滴静注		D1,8,15,22,29,36	ルート確保用/フィルター付きセットを使用すること
		生理食塩液　50mL	1	本				
		ﾃﾞｷｻｰﾄ　6.6mg	1	瓶				
		ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ　5mg	2	本				
	2	ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ20mg	1	本	点滴静注	30分	D1,8,15,22,29,36	
	3	生理食塩液　50mL	1	本	点滴静注	30分	D1,8,15,22,29,36	
		ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	100	mg/㎡				
	4	生理食塩液　250mL	1	本	点滴静注	60分	D1,8,15,22,29,36	
	5	生理食塩液　50mL	1	本	点滴静注	15分	D1,8,15,22,29,36	

減量基準

減量規定（副作用名等）	減量条件（検査値等）	抗癌剤名	減量割合等（減量後の割合又は投与量）

参考文献

A phase Ⅱ study of paclitaxel by weekly 1-h infusion for advanced or recurrent esophageal cancer in patient who had previously received platinum-based chemotherapy