

レジメン名 : IRIS療法

疾患名 : 大腸がん

投与間隔 (1コース期間) : 28日間

総コース数 : PDになるまで

特記事項 : UGT1A1測定必要

投与 順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注		D1、D15	ルート確保用
	パロノセロン点滴静注0.75mg	1	袋				
	2 デキサート 6.6mg	1	瓶	点滴静注	15分	D1、D15	
	イリノテカン	100	mg/m ²				
	3 生理食塩液 500mL	1	袋	点滴静注	90分	D1、D15	
	4 生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注	15分	D1、D15	
	S-1 80mg/m ² 2投2休						

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

- ①Muro K, et al. Irinotecan plus S-1 (IRIS) versus fluorouracil and folinic acid plus irinotecan (FOLFIRI) as second-line chemotherapy for metastatic colorectal cancer: a randomised phase 2/3 non-inferiority study (FIRIS study). Lancet Oncol. 2010; 11(9): 853-860
- ②Komatsu Y, et al. Phase II study of combined treatment with irinotecan and S-1 (IRIS) in patients with inoperable or recurrent advanced colorectal cancer (HGCSG0302). Oncology 2011; 80(1-2): 70-75