

レジメン名 : XELOX+BV

疾患名 : 大腸がん

投与間隔 (1コース期間) : 21日毎

総コース数 : PDになるまで

特記事項 :

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注		D1	ルート確保用
	パロノセロン点滴静注0.75mg	1	袋				
	2 デキサート 6.6mg	1	瓶	点滴静注	15分	D1	
	ペバシズマブ	7.5	mg/kg				
	3 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注		D1	初回90分、2回目60分、3回目以降30分まで短縮可
	オキサリプラチン	130	mg/m ²				
	4 5%ブドウ糖液 500mL	1	袋	点滴静注	120分	D1	
	5 生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	
	ゼロ-ダ 2000mg/m ² /日	2投1休					

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)
有害事象	Grade 3以上	オキサリプラチン	100mg/m ² →85mg/m ²

参考文献

- ①Saltz LB, et al. Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy as first-line therapy in metastatic colorectal cancer: a randomized phase III study. J Clin Oncol. 2008; 26; 2013-9
- ②J Cassidy, et al. XELOX vs FOLFOX-4 as first-line therapy for metastatic colorectal cancer: NO16966 updated results. Br J Cancer. 2011; 105; 58-64