

レジメン名 : ベバシズマブ療法(内服抗がん剤と併用)

疾患名 : 大腸がん

投与間隔(1コース期間) : 14日間

総コース数 : PDになるまで

特記事項 :

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m <sup>2</sup> , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日(Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注		D1	ルート確保用
	ベバシズマブ	5	mg/kg				
	2 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注		D1	初回90分、2回目60分、3 回目以降30分まで短縮可
	3 生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	
S-1:1.25m <sup>2</sup> 未満1回40mg、1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満1回50mg、1.5m <sup>2</sup> 以上1回60mg 1日2回28日間服用、14日間休薬							
UFT/ユーセル:UFT300mg/m <sup>2</sup> /日、ロイコリン75mg/日 21日服用7日間休薬							

#### 減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)
タンパク尿	2g/日	ベバシズマブ	中止

#### 参考文献

Combination chemotherapy with bevacizumab and S-1 for elderly patients with metastatic colorectal cancer (BASIC trial)  
M. Yoshida et al. / European Journal of Cancer 51 (2015) 935-941

Uracil-Tegafur and Oral Leucovorin Combined With Bevacizumab in Elderly Patients (Aged ≥ 75 Years) With Metastatic Colorectal Cancer: A Multicenter, Phase II Trial (Joint Study of Bevacizumab, Oral Leucovorin, and Uracil-Tegafur in Elderly Patients [J-BLUE] Study)