

レジメン名 : ベバシズマブ療法(内服抗がん剤と併用)

疾患名 : 大腸がん

投与間隔 (1コース期間) : 21日間

総コース数 : PDになるまで

特記事項 : \_\_\_\_\_

投与 順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m <sup>2</sup> , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液 100mL		1 本		点滴静注		ルート確保用
	ベバシズマブ		7.5 mg/kg				
	2 生理食塩液 100mL		1 本		点滴静注	D1	初回90分、2回目60分、3 回目以降30分まで短縮可
	3 生理食塩液 50mL		1 本		点滴静注	D1	
	内服抗がん剤 カベシタピン 2000mg/m <sup>2</sup> 分2 14日間内服 (2投1休)						
	S-1:28日内服(4投2休) →ベバシズマブ 5mg/kg						
	UFT/ユーゼル:21日内服(3投1休) →ベバシズマブ 5mg/kg						

**減量基準**

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

**参考文献**

- ・Tabbutt NC, et al. Capecitabine, bevacizumab, and mitomycin in first-line treatment of metastatic colorectal cancer: results of the Australasian Gastrointestinal Trials Group Randomized Phase III MAX Study. J Clin Oncol. 2010; 28; 3191-3198
- ・Cunningham D, et al. Bevacizumab plus capecitabine versus capecitabine alone in elderly patients with previously untreated metastatic colorectal cancer (AVEX): an open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2013; 14; 1077-1085