

レジメン名 : GC療法(short hydration)

疾患名 : 胆道がん(外科)

投与間隔 (1コース期間) : 21日間

総コース数 : PDになるまで

特記事項 :

投与 順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	ソリューゲンF 500mL	1	本	点滴静注:			
1	硫酸マグネシウム 20mL	8	mL	メイン	120分	D1、D8	short hydration
2	ソリューゲンF 500mL	1	本	点滴静注:メイン	120分	D1、D8	
3	パロセトロン点滴静注0.75mg デキサート 6.6mg	1	袋	点滴静注:			2本目のソリューゲンFと同 時に開始
	生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注:	15分	D1、D8	
4	ラシックス注 20mg	1	本	側管	15分	D1、D8	
5	シスプラチン 生理食塩液 250mL	25	mg/m ²	点滴静注:	60分	D1、D8	
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注:			
6	5%ブドウ糖液 100mL	1	本	側管	30分	D1、D8	
7	生理食塩液50mL	1	本	点滴静注:側管		D1、D8	フラッシュ用

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

- ①Valle J, et al. Cisplatin plus gemcitabine versus gemcitabine for biliary tract cancer. N Engl J Med. 2010; 362; 1273-81
- ②Okusaka T, et al. Gemcitabine alone or in combination with cisplatin in patients with biliary tract cancer: a comparative multicentre study in Japan. Br J Cancer. 2010; 103; 469-74