

レジメン名 : イミフィンジ+GC療法

疾患名 : 胆道がん(外科)

投与間隔 (1コース期間) : 21日間

総コース数 : 8回まで

特記事項 :

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m <sup>2</sup> , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.							
1	グーンF 500mL 硫酸マグネシウム 20mL		1本 8 mL	点滴静注: メイン	120分	D1、D8	フィルター付きセットを使用すること
2	イミフィンジ点滴静注 生理食塩液 250mL	1500 mg	1本	点滴静注: メイン	60分	D1	BW>30kg
3	グーンF 500mL	1本		点滴静注:メイン	120分	D1、D8	
4	パロセトロン点滴静注0.75m デキサート 6.6mg	1袋 1瓶		点滴静注: 側管	15分	D1、D8	2本目のグーンFと同時に開始
5	生理食塩液 50mL ラシックス注 20mg	1本 1本		点滴静注: 側管	15分	D1、D8	
6	シスプラチン 生理食塩液 250mL	25 mg/m <sup>2</sup> 1袋		点滴静注: 側管	60分	D1、D8	
7	ゲムシタビン 5%ブドウ糖液 100mL	1000 mg/m <sup>2</sup> 1本		点滴静注: 側管	30分	D1、D8	
8	生理食塩液50mL	1本		点滴静注:側管		D1、D8	フラッシュ用

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

Durvalumab plus Gemcitabine and Cisplatin in Advanced Biliary Tract Cancer June 1, 2022 NEJM Evid 2022; 1 (8)