レジメン名　：　DOC＋トラスツズマブ

疾患名　：　乳がん

投与間隔（1コース期間）　：　21日間

総コース数　：　術前・術後：4コース
進行再発：PDまで

特記事項　：　HER2陽性

	投与順序	レジメン内容（医薬品名）	投与量	単位（mg/㎡, V等）	投与方法（手技）	投与時間（速度等）	投与日（Day1等）	備考（内服薬の用法等）
Rp.	1	生理食塩液　100mL	1	本	点滴静注		D1	ルート確保用
		生理食塩液　100mL	1	本				
	2	デキサート	6.6	mg	点滴静注	15分	D1	
		トラスツズマブ	8	mg/kg				
	3	生理食塩液　250mL	1	袋	点滴静注	90分	D1（初回のみ）	
		トラスツズマブ	6	mg/kg				初回90分、2回目以降30分まで短縮可
	3'	生理食塩液　250mL	1	袋	点滴静注		D1（2回目以降）	
	4	生理食塩液　50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	
		ドセタキセル	60	mg/㎡				
	5	生理食塩液　250mL	1	袋	点滴静注	60分	D1	
	6	生理食塩液　50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	

減量基準

減量規定（副作用名等）	減量条件（検査値等）	抗癌剤名	減量割合等（減量後の割合又は投与量）

参考文献

①Sparano al,Long-Term Follow-Up of the E1199 Phase III Trial Evaluating the Role of Taxane and Schedule in Operable Breast Cancer . J Clin Oncol 33:2353-2360
②乳癌　診療ガイドライン　治療編　2018年版