

レジメン名 : TC(乳がん)

疾患名 : 乳がん

投与間隔 (1コース期間) : 21日間

総コース数 : 4コース

特記事項 :

| 投与 順序 | レジメン内容 (医薬品名) | 投与量 | 単位 (mg/m ² , V等) | 投与方法 (手技) | 投与時間 (速度等) | 投与日 (Day1等) | 備考 (内服薬の用法等) |
|----------|------------------|------|--------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| Rp. | 1 生理食塩液 100mL | 1 | 本 | 点滴静注 | | D1 | ルート確保用/ケモセフ使用 |
| | パロノセトロン点滴静注 | 0.75 | mg | | | | |
| | 2 テキサート 6.6mg | 1 | 瓶 | 点滴静注 | 15分 | D1 | |
| | ドセタキセル | 75 | mg/m ² | | | | |
| | 3 生理食塩液250mL | 1 | 本 | 点滴静注 | 1時間 | D1 | |
| | エンドキサン | 600 | mg/m ² | | | | |
| | 5 生理食塩液 100mL | 1 | 本 | 点滴静注 | 30分 | D1 | |
| | 6 生理食塩液 50mL | 1 | 本 | 点滴静注 | 15分 | D1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

減量基準

| 減量規定 (副作用名等) | 減量条件 (検査値等) | 抗癌剤名 | 減量割合等 (減量後の割合又は投与量) |
|-----------------|----------------|------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

参考文献

NCCNガイドラインVersion2.2019
「制吐薬適正使用ガイドライン」2015年10月【第2版】一部改訂版 ver.2.2 (2018年10月)