レジメン名　：　GS（GEM＋S-1）療法

疾患名　：　膵がん(外科）

投与間隔（1コース期間）　：21日間

総コース数　：　PDになるまで

特記事項　：

	投与順序	レジメン内容（医薬品名）	投与量	単位（mg/㎡,V等）	投与方法（手技）	投与時間（速度等）	投与日(Day1等)	備考（内服薬の用法等）
Rp.	1	生理食塩液　100mL	1	本	点滴静注		D1、D8	ルート確保用
		生理食塩液　50mL	1	本				
	2	ﾃﾞｷｻｰﾄ　6.6mg	1	瓶	点滴静注	15分	D1、D8	
		ゲムシタビン	1000	mg/㎡				
	3	5%ブドウ糖液　100mL	1	本	点滴静注	30分	D1、D8	
	4	生理食塩液　50mL	1	本	点滴静注	15分	D1、D8	
		S-1　60～120mg/日　14日間内服　（2投1休）						

減量基準

減量規定（副作用名等）	減量条件（検査値等）	抗癌剤名	減量割合等（減量後の割合又は投与量）

参考文献

①Ueno H, et al. Randomized phase III study of gemcitabine plus S-1, S-1 alone, or gemcitabine alone in patients with locally advanced and metastatic pancreatic cancer in Japan and Taiwan: GEST study. J Clin Oncol. 2013; 31; 1640-1648

②Min Kyoung Kim, et ali. S-1 and gemcitabine as an outpatient-based regimen in patients with advanced or metastatic pancreatic cancer. Jpn J Clin Oncol. 2009; 39; 49-53