レジメン名　：　SOX療法

疾患名　：　胃がん

投与間隔（1コース期間）　：　21日間

総コース数　：　PDになるまで

特記事項　：

	投与順序	レジメン内容（医薬品名）	投与量	単位（mg/㎡,V等）	投与方法（手技）	投与時間（速度等）	投与日(Day1等)	備考（内服薬の用法等）
Rp.	1	生理食塩液　100mL	1	本	点滴静注		D1	ﾙｰﾄ確保用
		ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注0.75mg	1	袋				
	2	ﾃﾞｷｻｰﾄ　6.6mg	1	瓶	点滴静注	15分	D1	
		ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	100	mg/㎡				
	3	5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　250mL	1	袋	点滴静注	120分	D1	
	4	生理食塩液　50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	
		S-1　80mg/㎡　14日間内服（2投1休）						

減量基準

減量規定（副作用名等）	減量条件（検査値等）	抗癌剤名	減量割合等（減量後の割合又は投与量）

参考文献

①Yamada Y, et al. Phase III study comparing oxaliplatin plus S-1 with cisplatin plus S-1 in chemotherapy-naïve patients with advanced gastric cancer. Ann Oncol. 2015; 26; 141-8

・Cunningham D, et al. Capecitabine and oxaliplatin for advanced esophagogastric cancer. N Engl J Med. 2008; 358; 36-46