

レジメン名 : SOX+トラスツスマブ療法

疾患名 : 胃がん

投与間隔 (1コース期間) : 21日間

総コース数 : PDになるまで

特記事項 : HER2陽性胃がん

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m <sup>2</sup> , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注		D1	ルート確保用
	パロセトロン注 0.75mg	1	袋				
	デキサト 6.6mg	1	瓶				
	2 デキサト 1.65mg	2	管	点滴静注	15分	D1	
	トラスツスマブ	8	mg/kg				
	注射用水 20mL	2	管				
	3 生理食塩液 250mL	1	本	点滴静注	90分	D1	
	トラスツスマブ	6	mg/kg				
	注射用水 20mL	1	管				
	3' 生理食塩液 250mL	1	本	点滴静注		D1	初回90分,2回目以降30分まで短縮可
	オキサリプラチン	100	mg/m <sup>2</sup>				
	4 5%ブドウ糖液 500mL	1	袋	点滴静注	120分	D1	
	5 生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	
	<b>S-1 1回40mg/m<sup>2</sup> 1日2回 14日間内服(2投1休)</b>						

#### 減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)
血小板減少	75000以下	オキサリプラチン	1段階減量
好中球減少	1000以下	オキサリプラチン/S-1	1段階減量
腎機能低下	eGFR60以下	S-1	60-40:1段階減量、40-30:2段階減量

#### 参考文献

エルプラット点滴静注液50mg、100mg、200mg適正使用ガイド(株式会社ヤクルト)  
 SOX療法投与開始・減量基準(大鵬薬品工業株式会社)  
 ハーセプチン適正使用ガイド(中外製薬)  
 胃癌治療ガイドライン2018年1月改訂第5版(日本胃癌学会)