

レジメン名 : オプジーボ療法  
疾患名 : 胃がん  
投与間隔 (1コース期間) : 14日間  
総コース数 : PDになるまで  
特記事項 : フィルター付きセットで投与

投与 順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m <sup>2</sup> , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生食100mL	1	瓶	点滴静注	15分	Day1	フィルター付きセットを使用
	2 オプジーボ	240	mg/body	点滴静注		Day1	
	生食100mL	76	mL	点滴静注	30分以上	Day1	オプジーボ入れた分生食を抜いて全量100mLにする
	3 生食50mL	1	瓶	点滴静注	15分	Day1	

#### 減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

#### 参考文献

Nivolumab in patients with advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer refractory to, or intolerant of, at least two previous chemotherapy regimens (ONO-4538-12, ATTRACTION-2): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Kang YK1, Boku N2, Satoh T3, Ryu MH1, Chao Y4, Kato K5, Chung HC6, Chen JS7, Muro K8, Kang WK9, Yeh KH10, Yoshikawa T11, Oh SC12, Bai LY13, Tamura T14, Lee KW15, Hamamoto Y16, Kim JG17, Chin K18, Oh DY19, Minashi K20, Cho JY21, Tsuda M22, Chen LT23. 2017 Dec 2;390(10111):2461-2471. doi: 10.1016/S0140-6736(17)31827-5. Epub 2017 Oct 6.