

レジメン名 : オプジーボ+SOX療法  
 疾患名 : 胃がん  
 投与間隔 (1コース期間) : 21日間  
 総コース数 : PDになるまで  
 特記事項 : HER2陰性胃がん

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m <sup>2</sup> , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液 100mL	1 本		点滴静注		D1	ルート確保用、フィルター付きセットを使用すること
	オプジーボ	360	mg/body				
	2 生理食塩液 100mL	64 mL		点滴静注	30分	D1	オプジーボを入れる分生食を抜いて全量100mLとする
	ハロ/セロン点滴静注0.75mg	1 袋					
	3 デキサート	9.9	mg	点滴静注	30分	D1	
	オキサリプラチン	130	mg/m <sup>2</sup>				
	4 5%ブドウ糖 500mL	1 袋		点滴静注	120分	D1	
	5 生理食塩液 50mL	1 本		点滴静注	15分	D1	
	S-1 80mg/m <sup>2</sup> 2投1休						

**減量基準**

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

**参考文献**

Safety and efficacy of nivolumab in combination with S-1/capecitabine plus oxaliplatin in patients with previously untreated, unresectable, advanced, or recurrent gastric/gastroesophageal junction cancer: interim results of a randomized, phase II trial (ATTRACTION-4) 2019 Feb 1;30(2):250-258.