レジメン名　：　　ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ療法 3週毎

疾患名　：　肝細胞癌（消化器科）

投与間隔（1コース期間）　：3週毎

総コース数　：PDまで

特記事項　：

	投与順序	レジメン内容（医薬品名）	投与量	単位（mg/㎡,V等）	投与方法（手技）	投与時間（速度等）	投与日(Day1等)	備考（内服薬の用法等）
Rp.	1	生理食塩液　100mL	1	瓶	点滴静注		D1	ルート確保用、ﾌｨﾙﾀｰ付きセットを使用すること
		テセントリク点滴静注	1200	mg/body				
	2	生理食塩液　250mL	1	本	点滴静注		D1	初回60分、2回目以降30分まで短縮可
		アバスチン点滴静注	15	mg/kg				
	3	生理食塩液100mL	1	瓶	点滴静注		D1	初回90分、2回目60分、3回目以降30分まで短縮可
	4	生理食塩液　50mL	1	瓶	点滴静注	15分	D1	

減量基準

減量規定（副作用名等）	減量条件（検査値等）	抗癌剤名	減量割合等（減量後の割合又は投与量）
免疫関連有害事象	Grade2以上	テセントリク	休薬、中止を検討
タンパク尿	2＋	アバスチン	休薬、中止を検討

参考文献

適正使用ガイド　切除不能な肝細胞癌(中外製薬)
Atezolizumab plus Bevcizumab in Unresectable Hepatocellular Carcinoma(N Engl J Med 382;20)
テセントリク、アバスチン添付文書