

レジメン登録申請書
(新規・変更・緊急)

申請日：西暦 年 月 日

診療科
申請医師

印

所属部科長

印

レジメン名 : リツキサン単剤療法
 疾患名 : 悪性リンパ腫 (CD20陽性非ホジキンリンパ腫)
 投与間隔 (1コース期間) : 7日間
 総コース数 : 最大8コース
 特記事項 : CD20陽性

登録番号 : 201710079

外来化学療法委員長	薬剤部登録
-----------	-------

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注		D1	ルート確保用
	生理食塩液 100mL	1	本				
	2 ポラミン注 5mg	1	本	点滴静注	30分	D1	アセトアミノフェン600mg内服する。2回目以降は省略可
	リツキサン	375	mg/m ²				初回50mL/時から開始。2回目以降100mL/時から開始。最大400mL/時で投与可能。
	3 生理食塩液 500mL	1	袋	点滴静注		D1	
	4 生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	
	リツキサンの投与時間について： 初回50mL/時から開始。2回目以降100mL/時から開始。最大400mL/時で投与可能。 状態に変化無ければ、初回30分毎に50mL/時までUP可。2回目以降は30分毎に100mL/時までUP可						

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

①Colombat P et al. Rituximab (anti-CD20 monoclonal antibody) as single first-line therapy for patients with follicular lymphoma with a low tumor burden: clinical and molecular evaluation. Blood. 2001; 97; 101-106

•Brice P et al. Comparison in low-tumor-burden follicular lymphomas between an initial no-treatment policy, prednimustine, or interferon alfa: a randomized study from the Groupe d'Etude des Lymphomes Folliculaires. Groupe d'Etude des Lymphomes de l'Adulte. *J Clin Oncol.* 1997; 15; 1110-1117