

レジメン名 : SIRB療法 3週毎

疾患名 : 大腸がん

投与間隔 (1コース期間) : 21日間

総コース数 : PDになるまで

特記事項 :

投与 順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注		D1	ルート確保用
	パロ/セロン点滴静注0.75m	1	袋				
	2 デキサート 6.6mg	1	瓶	点滴静注	15分	D1	
	ヘパシズマブ	7.5	mg/kg				
	3 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注		D1	初回90分、2回目60分、3 回目以降30分まで短縮可
	イリノテカン	150	mg/m ²				
	4 生理食塩液 500mL	1	袋	点滴静注	90分	D1	
	5 生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	
	S-1 80mg/m ² 2投1休						

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

・Yamada Y, et al. Phase II study of oral S-1 with irinotecan and bevacizumab (SIRB) as first-line therapy for patients with metastatic colorectal cancer. Invest New Drugs. 2012; 30(4); 1690-1696