

レジメン名 : XELOX

疾患名 : 大腸がん

投与間隔 (1コース期間) : 21日毎

総コース数 : 術後補助 3ヶ月または6ヶ月  
進行・再発 PDになるまで

特記事項 :

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m <sup>2</sup> , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注		D1	ルート確保用
	パロセトロン点滴静注0.75mg	1	袋				
	2 デキサート 6.6mg	1	瓶	点滴静注	15分	D1	
	オキサリプラチン	130	mg/m <sup>2</sup>				
	3 5%ブドウ糖液 500mL	1	袋	点滴静注	120分	D1	
	4 生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	
	ゼローダ 2000mg/m <sup>2</sup> /日	2投1休					

#### 減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)
有害事象	Grade 3以上	オキサリプラチン	100mg/m <sup>2</sup> →85mg/m <sup>2</sup>

#### 参考文献

- ①Cassidy j, et al. Randomized phase III study of capecitabine plus oxaliplatin compared with fluorouracil/folinic acid plus oxaliplatin as first-line therapy for metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol. 2008; 26; 2006-12
- ②Rothenberg ML, et al. Capecitabine plus oxaliplatin (XELOX) versus 5-fluorouracil/folinic acid plus oxaliplatin (FOLFOX-4) as second-line therapy in metastatic colorectal cancer: a randomized phase III noninferiority study. Ann of Oncol, 2008; 19; 1720-6
- ③Doi T, et al. Phase I/II study of capecitabine plus oxaliplatin (XELOX) plus bevacizumab as first-line therapy in Japanese patients with metastatic colorectal cancer. Jpn J Clin Oncol. 2010; 40; 913-20