レジメン名　：　ベバシズマブ療法（内服抗がん剤と併用）

疾患名　：　大腸がん

投与間隔（1コース期間）　：21日間

総コース数　：　PDになるまで

特記事項　：

	投与順序	レジメン内容（医薬品名）	投与量	単位（mg/㎡,V等）	投与方法（手技）	投与時間（速度等）	投与日(Day1等)	備考（内服薬の用法等）
Rp.	1	生理食塩液　100mL	1	本	点滴静注		D1	ルート確保用
		ベバシズマブ	7.5	mg/kg				初回90分、2回目60分、3回目以降30分まで短縮可
	2	生理食塩液　100mL	1	本	点滴静注		D1	
	3	生理食塩液　50mL	1	本	点滴静注		D1	
		内服抗がん剤　カペシタビン　2000mg/㎡　分2　14日間内服　（2投1休）						
		S-1:28日内服（4投2休）　→ベバシズマブ　5mg/kg						
		UFT/ユーゼル:21日内服（3投1休）　→ベバシズマブ　5mg/kg						

減量基準

減量規定（副作用名等）	減量条件（検査値等）	抗癌剤名	減量割合等（減量後の割合又は投与量）

参考文献

・Tabbutt NC, et al. Capecitabine, bevacizumab, and mitomycin in first-line treatment of metastatic colorectal cancer: results of the Australasian Gastrointestinal Trials Group Randomized Phase III MAX Study. J Clin Oncol. 2010; 28; 3191-3198

・Cunningham D, et al. Bevacizumab plus capecitabine versus capecitabine alone in elderly patients with previously untreated metastatic colorectal cancer (AVEX): an open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2013; 14; 1077-1085