レジメン名　：　GEM

疾患名　：　胆道がん(外科)

投与間隔（1コース期間）　：　28日間

総コース数　：　PDになるまで

特記事項　：

| | 投与順序 | レジメン内容（医薬品名） | 投与量 | 単位（mg/㎡,V等） | 投与方法（手技） | 投与時間（速度等） | 投与日(Day1等) | 備考（内服薬の用法等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. | 1 | 生理食塩液　100mL | 1 | 本 | 点滴静注 | | D1、D8、D15 | ルート確保用 |
| | | 生理食塩液　50mL | 1 | 本 | | | | |
| | 2 | デキサート　6.6mg | 1 | 瓶 | 点滴静注 | 15分 | D1、D8、D15 | |
| | | ゲムシタビン | 1000 | mg/㎡ | | | | |
| | 3 | 5%ブドウ糖液　100mL | 1 | 本 | 点滴静注 | 30分 | D1、D8、D15 | |
| | 4 | 生理食塩液　50mL | 1 | 本 | 点滴静注 | 15分 | D1、D8、D15 | |

**減量基準**

| 減量規定（副作用名等） | 減量条件（検査値等） | 抗癌剤名 | 減量割合等（減量後の割合又は投与量） |
|---|---|---|---|
| | | | |

**参考文献**

・okusaka T, et al. Phase II study of single-agent gemcitabine in patients with advanced biliary tract cancer. Cancer Chemother Pharmacol. 2006; 57; 647-53