

レジメン登録申請書  
(新規)

申請日：西暦 年 月 日

診療科  
申請医師

印

所属部科長

印

レジメン名 : mFOLFOX6 2週毎(ポンプ)

疾患名 : 胆道がん

投与間隔 (1コース期間) : 14日間

総コース数 : 12コースまで

登録番号 : 202305230

|            |       |
|------------|-------|
| 化学療法委員会委員長 | 薬剤部登録 |
|------------|-------|

特記事項 :

| 投与<br>順序 | レジメン内容<br>(医薬品名)    | 投与量  | 単位<br>(mg/m <sup>2</sup> , V等) | 投与方法<br>(手技)   | 投与時間<br>(速度等) | 投与日 (Day1等) | 備考<br>(内服薬の用法等)                          |
|----------|---------------------|------|--------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------------------------------------|
| Rp.      | 1 生食100mL           | 1    | 瓶                              | 点滴静注・メイン       | 15分           | Day1        | ルート確保用                                   |
|          | 2 パロセトロン点滴静注バッグ0.75 | 1    | 袋                              | 点滴静注・<br>メイン   | 15分           | Day1        |                                          |
|          | デキサート6.6mg          | 1    | 瓶                              |                |               |             |                                          |
|          | デキサート1.65mg         | 2    | 管                              | 点滴静注・<br>メイン   | 2時間           | Day1        | オキサリプラチンと同時に<br>2時間で投与                   |
|          | 3 5%ブドウ糖 250mL      | 1    | 袋                              | 点滴静注・<br>側管    | 2時間           | Day1        | レボホリナートと同時に<br>2時間で投与                    |
|          | レボホリナート             | 200  | mg/m <sup>2</sup>              | 点滴静注・<br>メイン   | 急速静注          | Day1        | レボホリナート終了後<br>全開で投与                      |
|          | 4 オキサリプラチン          | 85   | mg/m <sup>2</sup>              |                |               |             |                                          |
|          | 5%ブドウ糖 250mL        | 1    | 袋                              | 点滴静注・<br>メイン   | 46時間          | Day1        | ボラスのフルオロウラシル終了後<br>46時間で投与<br>全量140mLとする |
|          | フルオロウラシル            | 400  | mg/m <sup>2</sup>              | 点滴静注・<br>メイン   | 急速静注          | Day1        | 持続のフルオロウラシル終了後使用、フ<br>ラッシュ用              |
|          | 生食 50mL             | 1    | 本                              |                |               |             |                                          |
|          | 6 フルオロウラシル          | 2400 | mg/m <sup>2</sup>              | インヒューサー<br>ポンプ |               | Day1        |                                          |
|          | 生食 100mL            | 1    | 本                              |                |               | Day3        |                                          |
|          | 7 生食シリンジ20mL        | 1    | 本                              | 点滴静注・メイン       |               |             |                                          |

減量基準

| 減量規定<br>(副作用名等) | 減量条件<br>(検査値等)           | 抗癌剤名                                                      | 減量割合等<br>(減量後の割合又は投与量) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 好中球減少           | 500/mm <sup>3</sup> 未満   | オキサリプラチンを65mg/m <sup>2</sup> に減量<br>5-FUを20%減量(ボラス、持続ともに) |                        |
| 血小板減少           | 50000/mm <sup>3</sup> 未満 |                                                           |                        |
| t-Bil上昇         | 5mg/dL以上                 | 5-FU                                                      | 投与中止                   |

参考文献

Second-line FOLFOX chemotherapy versus active symptom control for advanced biliary tract cancer (ABC-06): a phase 3, open-label, randomised, controlled trial (Lancet Oncol. 2021 Mar 30;S1470-2045(21)00027-9. doi: 10.1016/S1470-2045(21)00027-9.)