

レジメン登録申請書 (新規・変更・緊急)

申請日：西暦 年 月 日

診療科
申請医師 印
所属部科長 印

レジメン名 : AC療法

疾患名 : 乳がん

投与間隔 (1コース期間) : 21日間

総コース数 : 最大6コース

特記事項 : ケモセーフ使用

登録番号 : 201710046

外来化学療法委員長	薬剤部登録
-----------	-------

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注		D1	ルート確保用/ケモセーフ使用/アプレビタント125mg内服確認すること
		ハロ/セロン点滴静注0.75m	1				
	2 デキサート 6.6mg	1	瓶	点滴静注	15分	D1	
		デキサート 1.65mg	2				
	3 ドキソルビシン	60	mg/m ²	点滴静注	30分	D1	生食50mL抜き取る
		生理食塩液 100mL	50				
	4 エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	30分	D1	
		生理食塩液 100mL	1				
	5 生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

- Fisher B, et al. Two months of doxorubicin-cyclophosphamide with and without interval reinduction therapy compared with 6 months of cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil in positive-node breast cancer patients with tamoxifen-nonresponsive tumors: results from the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project B-15. J Clin Oncol 1990; 8: 1483-96.
- Fisher B, et al. Tamoxifen and chemotherapy for axillary node-negative, estrogen receptor-negative breast cancer: findings from National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project B-23. J Clin Oncol 2001; 19(4) : 931-42.