

レジメン登録申請書  
(新規・変更・緊急)

2019年6月化学療法委員会にて変更承認済み

申請日：西暦 年 月 日

診療科  
申請医師

印

所属部科長

印

レジメン名 : FEC(100)療法

疾患名 : 乳がん

登録番号 : 201710106

投与間隔 (1コース期間) : 21日間

外来化学療法委員長	薬剤部登録
-----------	-------

総コース数 : 最大6コース

特記事項 : ケモセーフ使用で投与

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m <sup>2</sup> , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	併用薬 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注		D1	ケモセーフ使用 ルート確保用
	パロセトロン静注 0.75mg	1	袋				
	デキサート 6.6mg	2	瓶				
	2 デキサート 1.65mg	2	本	点滴静注	15分	D1	アプレピタント125mg内服 確認すること
	エピルピシン	100	mg/m <sup>2</sup>				
	3 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注	30分	D1	
	インドキサン	500	mg/m <sup>2</sup>				
	4 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注	30分	D1	
	フルオロウラシル	500	mg/m <sup>2</sup>				
	5 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注	10分	D1	
	6 生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

• Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group. Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials. Lancet 2005; 365; 1687-717

• French Adjuvant Therapy Group. Benefit of a high-dose epirubicin regimen in adjuvant chemotherapy for node-positive breast cancer patients with poor prognostic factors: 5-year follow-up results of French Adjuvant Study Group 05 randomized