

レジメン名 : DOC療法

疾患名 : 乳がん

投与間隔 (1コース期間) : 21日間

総コース数 : 術前・術後 4コースまで
再発・転移 PDになるまで

特記事項 :

投与 順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液100mL	1	本	点滴静注	ルート確保用	D1	ルート確保用
	生理食塩液50mL	1	袋				
2	デキサート注射液6.6mg	1	瓶	点滴静注	15分	D1	
	ドセタキセル	60	mg/m ²		60分		
3	生理食塩液 250mL	1	袋	点滴静注		D1	
4	生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

①Sparano JA, et al : Weekly paclitaxel in the adjuvant treatment of breast cancer. N Engl J Med, 2008; 358; 1663-167
 ・Chan S, et al : Prospective randomized trial of docetaxel versus doxorubicin in patients with metastatic breast cancer. J Clin Oncol, 1999; 17; 2341-2354
 ・がん化学療法レジメンハンドブック 改定第5版