

レジメン名 : DOC+トラスツズマブ

疾患名 : 乳がん

投与間隔 (1コース期間) : 21日間

総コース数 : 術前・術後:4コース
進行再発:PDまで

特記事項 : HER2陽性

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注		D1	ルート確保用
	生理食塩液 100mL	1	本				
	2 デキサート	6.6	mg	点滴静注	15分	D1	
	トラスツズマブ	8	mg/kg				
	3 生理食塩液 250mL	1	袋	点滴静注	90分	D1(初回のみ)	
	トラスツズマブ	6	mg/kg				
	3' 生理食塩液 250mL	1	袋	点滴静注		D1(2回目以降)	初回90分、2回目以降30分まで短縮可
	4 生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	
	ドセタキセル	60	mg/m ²				
	5 生理食塩液 250mL	1	袋	点滴静注	60分	D1	
	6 生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

- ① Sparano et al, Long-Term Follow-Up of the E1199 Phase III Trial Evaluating the Role of Taxane and Schedule in Operable Breast Cancer. J Clin Oncol 33:2353-2360
- ② 乳癌 診療ガイドライン 治療編 2018年版