

レジメン名 : トラスツズマブ 3週毎

疾患名 : 乳がん

投与間隔 (1コース期間) : 21日毎

総コース数 : 術前・術後 1年間
進行・再発 PDになるまで

特記事項 : HER2陽性

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/㎡, V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp. 1	生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注		D1	ルート確保用
	トラスツズマブ	8	mg/kg				
	注射用水 20mL	2	管				
2	生理食塩液 250mL	1	袋	点滴静注	90分	D1 (初回)	初回90分、2回目以降 30分まで短縮可
	トラスツズマブ	6	mg/kg				
	注射用水 20mL	1	管				
2'	生理食塩液 250mL	1	袋	点滴静注		D1 (2回目以降)	初回90分、2回目以降 30分まで短縮可
3	生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)
LVEFの著しい低下			
NYHA III/IVに該当する心障害		トラスツズマブ	中止

参考文献

- Piccart-Gebhart MJ, et al. Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2-positive breast cancer. N Engl J Med. 2005;
- Romond EH, et al. Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for operable HER2-positive breast cancer. N Engl J Med. 2005;