

レジメン名 : mFOLFIRINOX 2週毎

疾患名 : 膵がん

投与間隔 (1コース期間) 14日間

総コース数 : PDになるまで

特記事項 :

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp. 1	生理食塩液100mL	1	本	点滴静注・メイン		Day1	ルートキープ用
	ハロノセトロン0.75mg	1	袋				アプレピタン内服確認
2	デキサート6.6mg	1	瓶	点滴静注・メイン	30分	Day1	day2-5はデキサート注6.6mgまたはデカドロン錠8mgを投与してください。
	デキサート1.65mg	2	本				
3	生理食塩液50mL	1	本	点滴静注・メイン		Day1	全開で投与
4	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注・メイン	2時間	Day1	
	5%ブドウ糖 500mL	1	袋				
5	5%ブドウ糖 250mL	1	袋	点滴静注・メイン	2時間	Day1	オキサリプラチン投与終了後投与開始
	レボホリナート	300	mg				
6	イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注・側管	90分	Day1	レボホリナート投与開始30分後に投与開始
	生理食塩液 250mL	1	袋				
7	フルオロウラシル	2400	mg/m ²	点滴静注・メイン	46時間	Day1	
	生理食塩液	300	mL				
8	生理食塩液50mL	1	本	点滴静注・メイン	15分	Day3	5-FU終了後に投与

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

A.Fukutomi et al. Randomized phase II study of modified FOLFIRINOX versus gemcitabine plus nab-paclitaxel combination therapy for locally advanced pancreatic cancer:Japan Clinical Oncology Group Study(JCOG1407)