

レジメン名 : GS(GEM+S-1)療法

疾患名 : 膵がん(外科)

投与間隔 (1コース期間) : 21日間

総コース数 : PDになるまで

特記事項 :

投与 順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注		D1、D8	ルート確保用
	生理食塩液 50mL	1	本				
	2 テキサト 6.6mg	1	瓶	点滴静注	15分	D1、D8	
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²				
	3 5%ブドウ糖液 100mL	1	本	点滴静注	30分	D1、D8	
	4 生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注	15分	D1、D8	
S-1 60~120mg/日 14日間内服 (2投1休)							

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

- ①Ueno H, et al. Randomized phase III study of gemcitabine plus S-1, S-1 alone, or gemcitabine alone in patients with locally advanced and metastatic pancreatic cancer in Japan and Taiwan: GEST study. J Clin Oncol. 2013; 31; 1640-1648
- ②Min Kyoung Kim, et al. S-1 and gemcitabine as an outpatient-based regimen in patients with advanced or metastatic pancreatic cancer. Jpn J Clin Oncol. 2009; 39; 49-53