

# レジメン登録申請書 (新規)

申請日：西暦 年 月 日

診療科 申請医師 印

所属部科長 印

レジメン名 : mFOLFOX6 2週毎(ポンプ)

疾患名 : 膵がん

投与間隔 (1コース期間) : 14日間

総コース数 : PDまで

登録番号 : 202306236

化学療法委員会委員長	薬剤部登録
------------	-------

特記事項 :

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m <sup>2</sup> , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp. 1	生食 100mL	1	瓶	点滴静注・メイン	15分	Day1	ルート確保用
2	パロセトロン点滴静注バッグ0.75	1	袋	点滴静注・メイン	15分	Day1	
	デキサート6.6mg	1	瓶				
	デキサート1.65mg	2	管	点滴静注・メイン	2時間	Day1	オキサリプラチンと同時に2時間で投与
3	5%ブドウ糖 250mL	1	袋				
	レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注・側管	2時間	Day1	レボホリナートと同時に2時間で投与
4	オキサリプラチン	85	mg/m <sup>2</sup>				
	5%ブドウ糖 250mL	1	袋	点滴静注・メイン	急速静注	Day1	レボホリナート終了後全開で投与
5	フルオロウラシル	400	mg/m <sup>2</sup>				
	生食 50mL	1	本	インヒューサーポンプ	46時間	Day1	ホーナスのフルオロウラシル終了後46時間で投与全量140mLとする
6	フルオロウラシル	2400	mg/m <sup>2</sup>				
	生食 100mL	1	本	点滴静注・メイン		Day3	持続のフルオロウラシル終了後使用、フラッシュ用
7	生食シリンジ20mL	1	本				

### 減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

### 参考文献

PANGREOX: A Randomized Phase III Study of Fluorouracil/Leucovorin With or Without Oxaliplatin for Second-Line Advanced Pancreatic Cancer in Patients Who Have Received Gemcitabine-Based Chemotherapy  
NCCNガイドライン(膵がん)  
膵癌診療ガイドライン2019年版