

レジメン名 : キイトルーダ療法 3週毎

疾患名 : MSI-Hiを有する固形がん

投与間隔 (1コース期間) : 3週間

総コース数 : PDまで

特記事項 : インラインフィルターを使用
MSI-Highを有する固形がん

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/㎡, V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生食100mL キイトルーダ	1 200	本 mg/body	点滴静注		D1	ルート確保用、インラインフィルターを使用すること
	2 生食100mL	1	本	点滴静注	30分	D1	
	3 生食50mL	1	本	点滴静注		D1	フラッシュ用

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

Efficacy of pembrolizumab in patients with noncolorectal high microsatellite instability/mismatch repair-deficient cancer result from the phase II KEYNOTE-158 Study(Aurelien Marabelle et.al Journal of Clinical Oncology Volume38. 2020 Jan 1;38(1):11-19. 155.091.144.231
Phase II Open-Label Study of Pembrolizumab in Treatment-Refractory, Microsatellite Instability-High/Mismatch Repair-Deficient Metastatic Colorectal Cancer: KEYNOTE-164 Dung T Le et.al J Clin Oncol
キイトルーダ適正使用ガイド、添付文書