

レジメン名 : <<Bi-weekly>>CPT-11

疾患名 : 胃がん

投与間隔 (1コース期間) : 14日間

総コース数 : PDになるまで

特記事項 : UGT1A1測定

投与 順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m <sup>2</sup> , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp. 1	生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注		D1	ルート確保用
	パロセトロン点滴静注0.75m	1	袋				
2	デキサート 6.6mg	1	瓶	点滴静注	15分	D1	
	イリノテカン	150	mg/m <sup>2</sup>				
3	生理食塩液 500mL	1	袋	点滴静注	90分	D1	
4	生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

- Minamin H, et al. Irinotecan pharmacokinetics/pharmacodynamics and UGT1A genetic polymorphisms in Japanese: roles of UGT1A1\*6 and \*28. Pharmacogenet Genomics. 2007; 17: 497-504
- Hironaka S, et al. Randomized, open-label, phase III study comparing irinotecan with paclitaxel in patients with advanced gastric cancer without severe peritoneal metastasis after failure of prior combination chemotherapy using fluoropyrimidine plus platinum: WJOG 4007 trial. J Clin Oncol. 2013; 31: 4438-44