

レジメン名 : FOLFOX 2週毎(ポンプ)

疾患名 : 食道がん

投与間隔 (1コース期間) : 14日間

総コース数 : PDまで

特記事項 : CDDP不耐例

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生食100mL	1	瓶	点滴静注・メイン	15分	Day1	ルート確保用
	2 パロセトロン点滴静注バッグ0.75	1	袋	点滴静注・メイン	15分	Day1	
	デキサート6.6mg	1	瓶				
	デキサート1.65mg	2	管				
	3 5%ブドウ糖 250mL	1	袋	点滴静注・メイン	2時間	Day1	オキサリプラチンと同時に2時間で投与
	レボホリナート	200	mg/m ²				
	4 オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注・側管	2時間	Day1	レボホリナートと同時に2時間で投与
	5%ブドウ糖 250mL	1	袋				
	5 フルオウラシル	400	mg/m ²	点滴静注・メイン	急速静注	Day1	レボホリナート終了後全開で投与
	生食 50mL	1	本				
	6 フルオウラシル	2400	mg/m ²	インヒューサーポンプ	46時間	Day1	ホースのフルオウラシル終了後46時間で投与全量140mLとする
	生食 100mL	1	本				
	7 生食シリンジ20mL	1	本	点滴静注・メイン		Day3	持続のフルオウラシル終了後使用、フラッシュ用

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

日本食道学会お知らせ(食道癌に対するオキサリプラチンの使用について)