レジメン名　：5-FU+RT療法
疾患名　：大腸癌
投与間隔（1コース期間）　：7日間
総コース数　：5コースまで
特記事項　：放射線併用

	投与順序	レジメン内容（医薬品名）	投与量	単位（mg/㎡,V等）	投与方法（手技）	投与時間（速度等）	投与日（Day1等）	備考（内服薬の用法等）
Rp.	1	生食500mL	1	本	点滴静注メイン	24時間	D1	ﾙｰﾄ確保・ｷｰﾌﾟ用
	1'	生食500mL	1	本	点滴静注メイン	24時間	D2～D5	ﾙｰﾄｷｰﾌﾟ用
	2	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ ｿﾙﾃﾞﾑ3A輸液500mL	225 1	mg/㎡ 本	点滴静注側管	24時間	D1～D5	
	3	生理食塩液50mL	1	本	点滴静注側管		D5	ﾌﾗｯｼｭ用

減量基準

減量規定（副作用名等）	減量条件（検査値等）	抗癌剤名	減量割合等（減量後の割合又は投与量）

参考文献

Neoadjuvant 5-FU or Capecitabine Plus Radiation With or Without Oxaliplatin in Rectal Cancer Patients:A Phase Ⅲ Randomized Clinical Trial