

レジメン名 : GCS療法

疾患名 : 胆道がん

投与間隔 (1コース期間) : 14日間

総コース数 : PDになるまで

特記事項 :

投与 順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	ブイーンF 500mL		1 本	点滴静注:			
1	硫酸マグネシウム 20mL		8 mL	メイン	120分	D1	
2	ブイーンF 500mL		1 本	点滴静注:メイン	120分	D1	
3	ハロ/セトロン点滴静注0.75m		1 袋	点滴静注: 側管	15分	D1	2本目のブイーンFと同時に開始
	デキサート 6.6mg		1 瓶				
	デキサート 1.65mg		2 本				
4	生理食塩液 50mL		1 本	点滴静注: 側管	15分	D1	
	ラシックス注 20mg		1 本				
5	シスプラチン		25 mg/m ²	点滴静注: 側管	60分	D1	
	生食 500mL		1 袋				
6	ゲムシタビン		1000 mg/m ²	点滴静注: 側管	30分	D1	
	5%ブドウ糖液 100mL		1 本				
7	生理食塩液50mL		1 本	点滴静注:側管		D1	フラッシュ用
S-1: 80mg/m ² /日 1日2回朝夕食後 day1夕-day8朝							
1.25m ² 未満: 1回40mg							
1.25m ² ~1.5m ² : 1回50mg							
1.5m ² 以上: 1回60mg							

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

Randomized phase III study of gemcitabine, cisplatin plus S-1 versus gemcitabine, cisplatin for advanced biliary tract cancer (KHBO1401- MITSUBA)