

レジメン名 : AC療法
 疾患名 : 乳がん
 投与間隔 (1コース期間) : 21日間
 総コース数 : 最大6コース
 特記事項 : ケモセーフ使用

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液 100mL	1 本		点滴静注		D1	ルート確保用/ケモセーフ使用/アブリビント125mg内服確認すること
	パロ/セトロン点滴静注0.75m	1 袋					
	2 デキサート 6.6mg	1 瓶					
	デキサート 1.65mg	2 本		点滴静注	15分	D1	
	3 ドキソルビシン	60 mg/m ²					
	生理食塩液 100mL	50 mL		点滴静注	30分	D1	
	4 エンドキサン	600 mg/m ²					
	生理食塩液 100mL	1 本		点滴静注	30分	D1	
	5 生理食塩液 50mL	1 本		点滴静注	15分	D1	

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

- Fisher B, et al. Two months of doxorubicin–cyclophosphamide with and without interval reinduction therapy compared with 6 months of cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil in positive-node breast cancer patients with tamoxifen–nonresponsive tumors: results from the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project B-15. J Clin Oncol 1990; 8: 1483–96.
- Fisher B, et al. Tamoxifen and chemotherapy for axillary node-negative, estrogen receptor-negative breast cancer: findings from National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project B-23. J Clin Oncol 2001; 19(4) : 931–42.