

レジメン名 : DOC+フェスゴ療法 3週毎

疾患名 : HER2陽性乳がん

投与間隔 (1コース期間) : 21日

総コース数 : 手術不能または再発:PDまで
術前術後:4コース

特記事項 :

投与 順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 フェスゴIN	15	mL/body	皮下注	8分	D1(初回)	
	1' フェスゴMA	10	mL/body	皮下注	5分	D1(2回目以降)	
	2 生理食塩液100mL	1	本	点滴静注		D1	ルート確保用 初回30分、2回目以降 15分まで短縮可
	生理食塩液50mL	1	本				
	3 テキサート	6.6	mg	点滴静注	15分	D1	
	4 生理食塩液50mL	1	本	点滴静注		D1	
	ドセタキセル	60	mg/m ²				
	5 生理食塩液250mL	1	本	点滴静注	60分	D1	
	6 生理食塩液50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

フェスゴ添付文書

Fixed-dose combination of pertuzumab and trastuzumab for subcutaneous injection plus chemotherapy in HER2-positive early breast cancer(FeDeriCa): a randomised, open-label, multicentre, non-inferiority, phase3 study (Lancet Oncol . 2021 Jan;22(1):85-97. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30536-2. Epub 2020 Dec 21.)