

レジメン名 : PTX(3投1休)療法

疾患名 : 乳がん

投与間隔 (1コース期間) : 28日間

総コース数 : 術前・術後 4コース(12回)まで
進行・再発 PDになるまで

特記事項 : フィルター付きルート使用

投与 順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液 100mL	1	本	点滴静注	全開で投与	D1、D8、D15	フィルター付きセットを使用すること/ルート確保用
	生理食塩液 50mL	1	本				
	デキサト 6.6mg	1	瓶				
	ファモチジン20mg	1	本				
	2 ポラミン5mg	2	本				
3 生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注	30分	D1、D8、D15		
	ハクリタセル	80	mg/m ²				
4 生理食塩液 250mL	1	袋	点滴静注	60分	D1、D8、D15		
5 生理食塩液 50mL	1	本	点滴静注	15分	D1、D8、D15		

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

- ①Henderson IC, et al. Improved outcomes from adding sequential Paclitaxel but not from escalating Doxorubicin dose in an adjuvant chemotherapy regimen for patients with node-positive primary breast cancer. J Clin Oncol 2003; 21: 976-83
- ・Seidman AD, et al. Dose-dense therapy with weekly 1-hour paclitaxel infusions in the treatment of metastatic breast cancer. J Clin Oncol 1998; 16: 3353-61
- ・がん化学療法レジメンハンドブック 改定第5版
- ・がん診療レジレントマニュアル 第7版