

レジメン名 : DOC+トラスツスマブ+パルツスマブ療法 3週毎

疾患名 : HER2陽性乳がん

投与間隔 (1コース期間) : 21日

総コース数 : 手術不能または再発: PDまで
術前術後: 4コース

特記事項 :

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液100mL	1	本	点滴静注		D1	ルート確保用
	パージェタ	840	mg/body				
	2 生理食塩液250mL	1	本	点滴静注	60分	D1(初回)	
	パージェタ	420	mg/body				
	2' 生理食塩液250mL	1	本	点滴静注		D1(2回目以降)	初回60分、2回目以降 30分まで短縮可
	3 生理食塩液50mL	1	本	点滴静注		D1	初回60分、2回目以降 30分まで短縮可
	トラスツスマブ	8	mg/kg				
	注射用水20mL	2	管				
	4 生理食塩液250mL	1	本	点滴静注	90分	D1(初回)	
	トラスツスマブ	6	mg/kg				
	注射用水20mL	1	管				
	4' 生理食塩液250mL	1	本	点滴静注		D1(2回目以降)	初回90分、2回目以降 30分まで短縮可
	5 生理食塩液50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	
	生理食塩液50mL	1	本				
	6 テキサート	6.6	mg	点滴静注	15分	D1	
	トセタキセル	60	mg/m ²				
	7 生理食塩液250mL	1	本	点滴静注	60分	D1	
	8 生理食塩液50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)
心機能障害	LVEF<50%、10ポイント以上の低下	トラスツスマブ パージェタ	投与延期、中止

参考文献

Adjuvant pertuzumab and trastuzumab in early HER2-1 positive breast cancer (APHINIT試験) The New England Journal of Medicine July 13,2017

Pertuzumab plus trastuzumab in combination with standard neoadjuvant anthracycline-containing and anthracycline-free chemotherapy regimens in patients with HER2-positive early breast cancer: a randomized phase II cardiac safety study (TRYPHAENA) Annals of Oncology 24: 2278-2284, 2013

Pertuzumab plus Trastuzumab plus Docetaxel for Metastatic Breast Cancer(CLEOPATRA)The New England Journal of Medicine . 2012 Jan 12; 366(2): 109-119.