

レジメン名 : トラスツスマブ(6mg/kg)+ヘルツスマブ(420mg)療法

疾患名 : HER2陽性乳がん

投与間隔 (1コース期間) : 21日

総コース数 : 手術不能または再発:PDまで
術前術後:1年間

特記事項 :

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/㎡, V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液100mL	1	本	点滴静注		D1	ルート確保用
	ハーゼータ	420	mg/body				
	2 生理食塩液250mL	1	本	点滴静注		D1	初回60分、2回目以降 30分まで短縮可
	3 生理食塩液50mL	1	本	点滴静注		D1	初回60分、2回目以降 30分まで短縮可
	トラスツスマブ	6	mg/kg				
	注射用水20mL	1	管				
	4 生理食塩液250mL	1	本	点滴静注		D1	初回90分、2回目以降 30分まで短縮可
	5 生理食塩液50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)
心機能障害	LVEF<50%、10ポイント以上の 低下	トラスツスマブ ヘルツスマブ	投与延期、中止

参考文献

Adjuvant pertuzumab and trastuzumab in early HER2-1positive breast cancer (APHINIT試験) The New England Journal of Medicine July 13,2017

chemotherapy regimens in patients with HER2-positive early breast cancer: a randomized phase II cardiac safety study (TRYPHAENA) Annals of Oncology 24: 2278-2284, 2013

Pertuzumab plus Trastuzumab plus Docetaxel for Metastatic Breast Cancer(CLEOPATRA)The New England Journal of Medicine . 2012 Jan 12; 366(2): 109-119.