レジメン名　：　SOX療法

疾患名　：　胃がん

投与間隔（1コース期間）　：21日間

総コース数　：　PDになるまで

特記事項　：

| | 投与順序 | レジメン内容（医薬品名） | 投与量 | 単位（mg/㎡,V等） | 投与方法（手技） | 投与時間（速度等） | 投与日(Day1等) | 備考（内服薬の用法等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. | 1 | 生理食塩液　100mL | 1 | 本 | 点滴静注 | | D1 | ﾙｰﾄ確保用 |
| | | ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注0.75m | 1 | 袋 | | | | |
| | | ﾃﾞｷｻｰﾄ　1.62mg | 2 | 本 | | | | |
| | 2 | ﾃﾞｷｻｰﾄ　6.6mg | 1 | 瓶 | 点滴静注 | 15分 | D1 | |
| | | ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ | 100 | mg/㎡ | | | | |
| | 3 | 5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　250mL | 1 | 袋 | 点滴静注 | 120分 | D1 | |
| | 4 | 生理食塩液　50mL | 1 | 本 | 点滴静注 | 15分 | D1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | S-1　80mg/㎡　14日間内服(2投1休) | | | | | | |

**減量基準**

| 減量規定（副作用名等） | 減量条件（検査値等） | 抗癌剤名 | 減量割合等（減量後の割合又は投与量） |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**参考文献**

①Yamada Y, et al. Phase III study comparing oxaliplatin plus S-1 with cisplatin plus S-1 in chemotherapy-naïve patients with advanced gastric cancer. Ann Oncol. 2015; 26; 141-8

・Cunningham D, et al. Capecitabine and oxaliplatin for advanced esophagogastric cancer. N Engl J Med. 2008; 358; 36-46