レジメン名　：　<<Bi-weekly>>CPT-11

疾患名　：　胃がん

投与間隔（1コース期間）　：　14日間

総コース数　：　PDになるまで

特記事項　：　UGT1A1測定

	投与順序	レジメン内容（医薬品名）	投与量	単位（mg/㎡,V等）	投与方法（手技）	投与時間（速度等）	投与日(Day1等)	備考（内服薬の用法等）
Rp.	1	生理食塩液　100mL	1	本	点滴静注		D1	ルート確保用
		ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注0.75m	1	袋				
	2	デキサート　6.6mg	1	瓶	点滴静注	15分	D1	
		イリノテカン	150	mg/㎡				
	3	生理食塩液　500mL	1	袋	点滴静注	90分	D1	
	4	生理食塩液　50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	

減量基準

減量規定（副作用名等）	減量条件（検査値等）	抗癌剤名	減量割合等（減量後の割合又は投与量）

参考文献

・Minamin H, et al. Irinotecan pharmacokinetics/pharmacodynamics and UGT1A genetic polymorphisms in Japanese: roles of UGT1A1*6 and *28. Pharmacogenet Genomics. 2007; 17; 497-504

・Hironaka S, et al. Randomized, open-label, phase III study comparing irinotecan with paclitaxel in patients with advanced gastric cancer without severe peritoneal metastasis after failure of prior combination chemotherapy using fluoropyrimidine plus platinum: WJOG 4007 trial. J Clin Oncol. 2013; 31; 4438-44