レジメン名　：　DOC＋PSL（DP）療法

疾患名　：　前立腺がん

投与間隔（1コース期間）　：21日間

総コース数　：　PDになるまで

特記事項　：

	投与順序	レジメン内容（医薬品名）	投与量	単位（mg/㎡,V等）	投与方法（手技）	投与時間（速度等）	投与日(Day1等)	備考（内服薬の用法等）
Rp.	1	生理食塩液　100mL	1	本	点滴静注		D1	ﾙｰﾄ確保用
		生理食塩液　50mL	1	本				
	2	ﾃﾞｷｻｰﾄ　6.6mg	1	瓶	点滴静注	30分	D1	
		ドセタキセル	75	mg/㎡				
	3	生理食塩液　250mL	1	袋	点滴静注	60分	D1	
	4	生理食塩液　50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	
		PSL(5mg)x2で連日投与						

減量基準

減量規定（副作用名等）	減量条件（検査値等）	抗癌剤名	減量割合等（減量後の割合又は投与量）

参考文献

・Tannock, IF, et al. Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer. N Engl J Med. 2004; 351; 1502-12

②berthold Dr, et al. Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer: updated survival in the TAX 327 study. J Clin Oncol. 2008; 26; 242-245