レジメン名　：　IRIS+BV療法

疾患名　：　大腸がん

投与間隔（1コース期間）　：28日間

総コース数　：　PDになるまで

特記事項　：UGT1A1測定必要

	投与順序	レジメン内容（医薬品名）	投与量	単位（mg/㎡,V等）	投与方法（手技）	投与時間（速度等）	投与日(Day1等)	備考（内服薬の用法等）
Rp.	1	生理食塩液　100mL	1	本	点滴静注		D1、D15	ルート確保用
		ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注0.75m	1	袋				
	2	デキサート　6.6mg	1	瓶	点滴静注	15分	D1、D15	
		ベバシズマブ	5	mg/kg				
	3	生理食塩液　100mL	1	本	点滴静注		D1、D15	初回90分、2回目60分、3回目以降30分まで短縮可
	4	生理食塩液　50mL	1	本	点滴静注	15分	D1、D15	
		イリノテカン	100	mg/㎡				
	5	生理食塩液　500mL	1	袋	点滴静注	90分	D1、D15	
	6	生理食塩液　50mL	1	本	点滴静注	15分	D1、D15	
		S-1　80mg/㎡　2投2休						

減量基準

減量規定（副作用名等）	減量条件（検査値等）	抗癌剤名	減量割合等（減量後の割合又は投与量）

参考文献

・Muro K, et al. Irinotecan plus S-1 (IRIS) versus fluorouracil and folinic acid plus irinotecan (FOLFIRI) as second-line chemotherapy for metastatic colorectal cancer: a randomised phase 2/3 non-inferiority study (FIRIS study). Lancet Oncol. 2010; 11(9): 853-860

②Komatsu Y, et al. Phase II study of combined chemotherapy with irinotecan and S-1 (IRIS) plus bevacizumab in patients with inoperable recurrent or advanced colorectal cancer. Acta Oncol. 2012; 51(7); 867-872