

レジメン名 : mFOLFOX6+BV(5mg/kg) 2週毎(ポンプ)

疾患名 : 大腸がん

投与間隔(1コース期間) : 14日間

総コース数 : PDになるまで

特記事項 :

| 投与順序  | レジメン内容<br>(医薬品名) | 投与量  | 単位<br>(mg/m <sup>2</sup> , V等) | 投与方法<br>(手技) | 投与時間<br>(速度等) | 投与日 (Day1等) | 備考<br>(内服薬の用法等)                      |
|-------|------------------|------|--------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------|
| Rp. 1 | 生食 100mL         | 1    | 瓶                              | 点滴静注・メイン     | 15分           | Day1        | ルート確保用                               |
| 2     | パロセロン点滴静注バッグ0.75 | 1    | 袋                              | 点滴静注・メイン     | 15分           | Day1        |                                      |
|       | デキサート6.6mg       | 1    | 瓶                              |              |               |             |                                      |
|       | デキサート1.65mg      | 2    | 管                              |              |               |             |                                      |
| 3     | ペバシズマブ           | 5    | mg/kg                          | 点滴静注・メイン     |               | Day1        | 初回90分、2回目60分、3回目以降30分まで短縮可           |
|       | 生理食塩液 100mL      | 1    | 本                              | 点滴静注・メイン     | 2時間           | Day1        | オキサリプラチンと同時に2時間で投与                   |
| 4     | 5%ブドウ糖 250mL     | 1    | 袋                              |              |               |             |                                      |
|       | レボホリナート          | 200  | mg/m <sup>2</sup>              | 点滴静注・側管      | 2時間           | Day1        | レボホリナートと同時に2時間で投与                    |
| 5     | オキサリプラチン         | 85   | mg/m <sup>2</sup>              |              |               |             |                                      |
|       | 5%ブドウ糖 250mL     | 1    | 袋                              | 点滴静注・メイン     | 急速静注          | Day1        | レボホリナート終了後全開で投与                      |
| 6     | フルオロウラシル         | 400  | mg/m <sup>2</sup>              |              |               |             |                                      |
|       | 生食 50mL          | 1    | 本                              | インヒューサーポンプ   | 46時間          | Day1        | ポーチのフルオロウラシル終了後46時間で投与<br>全量140mLとする |
| 7     | フルオロウラシル         | 2400 | mg/m <sup>2</sup>              |              |               |             |                                      |
|       | 生食 100mL         | 1    | 本                              | 点滴静注・メイン     |               | Day3        | 持続のフルオロウラシル終了後使用、フラッシュ用              |
| 8     | 生食 シリンジ20mL      | 1    | 本                              |              |               |             |                                      |

減量基準

| 減量規定<br>(副作用名等) | 減量条件<br>(検査値等)           | 抗癌剤名  | 減量割合等<br>(減量後の割合又は投与量) |
|-----------------|--------------------------|---|------------------------|
| 好中球減少           | 500/mm <sup>3</sup> 未満   | オキサリプラチンを65mg/m <sup>2</sup> に減量<br>5-FUを20%減量(ポーチ、持続ともに) |                        |
| 血小板減少           | 50000/mm <sup>3</sup> 未満 |   |                        |
| t-Bil上昇         | 5mg/dL以上                 | 5-FU  | 投与中止                   |

参考文献

- ①大腸癌治療ガイドライン 医師用 2019年版
- ②制吐薬適正使用ガイドライン2015年10月(第2版)
- ③改訂第6版がん化学療法レジメンハンドブック