

レジメン名 : キイトルーダ+GC療法

疾患名 : 胆道がん

投与間隔 (1コース期間) : 21日間

総コース数 : CDDPは8回まで

特記事項 :

投与 順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	ウーイーンF 500mL		1 本	点滴静注:			
1	硫酸マグネシウム 20mL		8 mL	メイン	120分	D1、D8	フィルター付きセットを使用すること
2	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注:			
	生理食塩液 100mL		1 本	メイン	30分	D1	
3	ウーイーンF 500mL		1 本	点滴静注:メイン	120分	D1、D8	
	パロ/セロン点滴静注0.75m		1 袋				
	デキサート 6.6mg		1 瓶	点滴静注:			
4	デキサート 1.65mg		2 本	側管	15分	D1、D8	2本目のウーイーンFと同時に開始
	生理食塩液 50mL		1 本	点滴静注:			
5	ラシックス注 20mg		1 本	側管	15分	D1、D8	
	シスプラチン	25	mg/m ²	点滴静注:			
6	生理食塩液 250mL		1 袋	側管	60分	D1、D8	
	ゲムシタピン	1000	mg/m ²	点滴静注:			
7	5%ブドウ糖液 100mL		1 本	側管	30分	D1、D8	
8	生理食塩液50mL		1 本	点滴静注:側管		D1、D8	フラッシュ用

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

Pembrolizumab in combination with gemcitabine and cisplatin compared with gemcitabine and cisplatin alone for patients with advanced biliary tract cancer(KEYNOTE-966):a randomised,double-blind,placebo-controlled,phase 3 trial.