レジメン名　：キイトルーダ＋GEM療法

疾患名　：胆道がん

投与間隔（1コース期間）　：21日間

総コース数　：PDまで

特記事項　：ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+GC療法後

	投与順序	レジメン内容（医薬品名）	投与量	単位（mg/㎡,V等）	投与方法（手技）	投与時間（速度等）	投与日(Day1等)	備考（内服薬の用法等）
Rp.	1	生食100mL	1	本	点滴静注		D1	フィルター付きセットを使用すること
	1'	生食100mL	1	本	点滴静注		D8	
		キイトルーダ	200	mg/body				
	2	生理食塩液　100mL	1	本	点滴静注	30分	D1	
		生理食塩液50mL	1	本				
	3	デキサート　6.6mg	1	瓶	点滴静注	15分	D1、D8	
		ゲムシタビン	1000	mg/㎡				
	4	5%ブドウ糖液　100mL	1	本	点滴静注	30分	D1、D8	
	5	生理食塩液50mL	1	本	点滴静注		D1、D8	フラッシュ用

減量基準

減量規定（副作用名等）	減量条件（検査値等）	抗癌剤名	減量割合等（減量後の割合又は投与量）

参考文献

Pembrolizumab in combination with gemcitabine and cisplatin compared with gemcitabine and cisplatin alone for patients with advanced biliary tract cancer(KEYNOTE-966):a randomised,double-blind,placebo-controlled,phase 3 trial.