

レジメン名 : CDDP+放射線療法

疾患名 : 頭頸部がん

投与間隔 (1コース期間) : 21日間

総コース数 : 3コース

特記事項 : 放射線併用

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/m ² , V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生理食塩液 250mL		1 袋	点滴静注:メイン	60分	D1	
	グラニセトロン 1mg		1 袋				
	デキサート 6.6mg		2 瓶				
	2 ファモチジン注 20mg		1 本	点滴静注: 側管	15分	D1	
	シスプラチン		80 mg/m ²	点滴静注: メイン			シスプラチン投与後放射線照射
	3 生理食塩液 500mL		300 mL		120分	D1	
	4 マンニトールS 300mL		1 本	点滴静注:側管	60分	D1	
	生理食塩液 50mL		1 本	点滴静注: 側管			
	5 ラシックス注 20mg		1 本		15分	D1	
	生理食塩液 50mL		1 本	点滴静注: 側管			
	6 ファモチジン注 20mg		1 本		15分	D1	
	7 生理食塩液 1000mL		1 袋	点滴静注:メイン	5時間	D1	
	8 生理食塩液 1000mL		1 袋	点滴静注:メイン	5時間	D1	
	生理食塩液 100mL		1 本				
	デキサート 6.6mg		1 瓶	点滴静注: 側管			
	9 ファモチジン注 20mg		1 本		30分	D2、D3	
	生理食塩液 100mL		1 本				
	デキサート 1.65mg		2 本	点滴静注: 側管			
	9' ファモチジン注 20mg		1 本		15分	D4、D5	
	10 生理食塩液 1000mL		1 袋	点滴静注:メイン	5時間	D2、D3、D4、D5	
	生理食塩液 50mL		1 本	点滴静注: 側管			
	11 ファモチジン注 20mg		1 本		15分	D2、D3、D4、D5	

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

- Forastiere AA, et al. Concurrent chemotherapy and radiotherapy for organ preservation in advanced laryngeal cancer. N Engl J Med. 2003; 349: 2091-8
- Adelstein DJ, et al. An intergroup phase III comparison of standard radiation therapy and two schedules of concurrent chemoradiotherapy in patients with unresectable squamous cell head and neck cancer. J Clin Oncol. 2003; 21; 92-8
- Bernier J, et al. Defining risk levels in locally advanced head and neck cancers: a comparative analysis of concurrent postoperative radiation plus chemotherapy trials of the EORTC (#22931) and RTOG (# 9501). Head Neck. 2005; 27; 843-50